

Infórmese

El VIH es el virus
que causa el SIDA.

Hacerse la prueba del VIH
durante el embarazo es
una decisión importante.

Lo primero que debe saber es que
hacerse la prueba del VIH es
una decisión
voluntaria.

Antes de hacer una elección
que la afectará a usted y a su
bebé, la invitamos a informarse
sobre la prueba del VIH.



¿Necesita más información sobre el VIH y el SIDA?

Comuníquese con la Línea
Nacional de SIDA del CDC al:
1 800-342-AIDS (en inglés)
1 800-344-7432 (en español)

Desarrollado en colaboración conjunta con la
Universidad de California, San Francisco,
Centro de Estudios para la Prevención del
SIDA; la Universidad de Carolina del Norte
en Chapel Hill, Departamento de Medicina
Social; y el Centro Battelle de Investigación y
Evaluación para la Salud Pública, Durham,
Carolina del Norte.



Patrocinado por el Instituto Nacional de Salud Mental
1 R03 MH62214-01

¿Sabía usted que su médico le puede hacer la prueba del VIH?



El embarazo y la prueba del VIH

¿Por qué es bueno saber si tiene VIH cuando está embarazada?

El VIH es el virus que causa el SIDA.

Todas las mujeres deberían saber si son VIH positivas. Cualquier mujer puede estar a riesgo aún sin saberlo.

Una mujer embarazada puede transmitir el VIH a su bebé. Pero...

Si toma medicamentos, una madre VIH positiva puede tener un bebé que nazca sin el virus.



¿Qué debería saber sobre la prueba del VIH durante el embarazo?

- La prueba del VIH es confidencial y se hace en la primera o segunda visita médica prenatal.
- Casi siempre, el médico le avisará que le hará la prueba del VIH.
- Tal vez necesite decirle a su médico que está de acuerdo con que le hagan la prueba. Quizás deba firmar un consentimiento.
- Puede que su médico le haga la prueba del VIH como parte de los exámenes prenatales de rutina.
- Usted puede decirle a su médico que no quiere que le hagan la prueba del VIH.

¿Cómo recibirá usted los resultados de su prueba?

- Su doctor debe informarle si el resultado de su prueba es positivo o negativo.
- Si el resultado es positivo, un especialista hablará con usted sobre los pasos a seguir.



Deberá tomar muchas decisiones durante su embarazo.

Hacerse la prueba del VIH es una de ellas.



Si tiene dudas sobre el VIH, hable con su médico antes de aceptar que le hagan la prueba del VIH.

Infórmese

El VIH es el virus que causa el SIDA.

Hacerse la prueba del VIH durante el embarazo es una decisión importante.

Lo primero que debe saber es que hacerse la prueba del VIH es una decisión **voluntaria.**

Antes de hacer una elección que la afectará a usted y a su bebé, la invitamos a informarse sobre la prueba del VIH.



¿Necesita más información sobre el VIH y el SIDA?

Comuníquese con la Línea Nacional de SIDA del CDC al:
1 800-342-AIDS (en inglés)
1 800-344-7432 (en español)

Desarrollado en colaboración conjunta con la Universidad de California, San Francisco, Centro de Estudios para la Prevención del SIDA; la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Departamento de Medicina Social; y el Centro Battelle de Investigación y Evaluación para la Salud Pública, Durham, Carolina del Norte.



Patrocinado por el Instituto Nacional de Salud Mental
1 R03 MH62214-01

¿Sabía usted que su médico le puede hacer la prueba del VIH?



El embarazo y la prueba del VIH

¿Por qué es bueno saber si tiene VIH cuando está embarazada?

El VIH es el virus que causa el SIDA.

Todas las mujeres deberían saber si son VIH positivas. Cualquier mujer puede estar a riesgo aún sin saberlo.

Una mujer embarazada puede transmitir el VIH a su bebé. Pero...

Si toma medicamentos, una madre VIH positiva puede tener un bebé que nazca sin el virus.



¿Qué debería saber sobre la prueba del VIH durante el embarazo?

- La prueba del VIH es confidencial y se hace en la primera o segunda visita médica prenatal.
- Casi siempre, el médico le avisará que le hará la prueba del VIH.
- Tal vez necesite decirle a su médico que está de acuerdo con que le hagan la prueba. Quizás deba firmar un consentimiento.
- Puede que su médico le haga la prueba del VIH como parte de los exámenes prenatales de rutina.
- Usted puede decirle a su médico que no quiere que le hagan la prueba del VIH.

¿Cómo recibirá usted los resultados de su prueba?

- Su doctor debe informarle si el resultado de su prueba es positivo o negativo.
- Si el resultado es positivo, un especialista hablará con usted sobre los pasos a seguir.

Deberá tomar muchas decisiones durante su embarazo.

Hacerse la prueba del VIH es una de ellas.



Si tiene dudas sobre el VIH, hable con su médico antes de aceptar que le hagan la prueba del VIH.